



EXEMPELFÖRPACKNINGEN NYSSTOPP





BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Nysstopp 10 mg tabletter

cetirizin

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Använd detta läkemedel uttryckligen på det sätt som beskrivs i denna bipacksedel.
- Förvara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Om du upptäcker biverkningar, kontakta en läkare eller apotekspersonalen. Detta gäller också sådana eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel.

I denna bipacksedel finns information om:

1. Vad Nysstopp är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Nysstopp-tabletter
3. Hur Nysstopp-tabletter ska tas
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nysstopp-tabletterna ska förvaras
6. Vad förpackningen innehåller och annan information

1. Vad Nysstopp är och vad det används för

Cetirizin verkar genom att förhindra åtgärder av histamin. Histamin orsakar allergisymtom, såsom röda ögon. Histamin frigörs i kroppen då en människa exponeras för ett allergiframkallande ämne, t.ex. björkpollen.

Cetirizin används för behandling och förebyggande av allergiska symtom. Sådana symtom är:

- allergisk snuva (täpphet eller rinnande snuva, kittlande näsa och nysningar),
- allergiska ögonsymtom (röda, rinnande och kliande ögon),
- allergiskt nässelutslag, dvs. urtikaria,
- samt hudbesvär som beror på insektsting.

2. Vad du behöver veta innan du tar Nysstopp-tabletter

Använd inte Nysstopp-tabletter om:

- du är överkänslig mot cetirizin eller någon annan substans som ingår i Nysstopp-tabletterna (se punkt 6 i bipacksedeln)
- du har en allvarlig nedsatt njurfunktion

Varningar och försiktighet

- om du har epilepsi eller riskerar att få kramper, ska du rådgöra med en läkare innan du börjar använda detta läkemedel
- om du ska genomgå allergitest, ska du upphöra med att använda detta läkemedel tre dygn före testen

Nysstopp och andra läkemedel

Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om alla de läkemedel som du använder. Detta gäller både receptbelagda och receptfria läkemedel, egenvårdsläkemedel och kosttillskott. Kom också ihåg att nämna om du nyligen har tagit något annat läkemedel. Inverkan av vissa andra läkemedel kan förändras eller så kan de ändra Nysstopp-tabletternas inverkan, om de används samtidigt.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar eller du misstänker att du är gravid, ska du rådfråga en läkare eller apotekspersonalen innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Nysstopp ger i allmänhet inte försämrad vaksamhet eller prestationsförmåga. Hos vissa patienter kan Nysstopp orsaka trötthet eller andra biverkningar som försämrar prestationsförmågan (punkt 4 i bipacksedeln). I sådant fall ska man undvika körande och andra uppgifter som kräver noggrannhet.

3. Hur Nysstopp-tabletter ska tas

Tabletterna ska tas med en tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten).

Måltider inverkar inte på läkemedlets effekt. Läkemedlet kan tas i samband med en måltid eller på fastande mage.

Läkemedlet kan användas regelbundet eller alltid vid behov under pollenperioder. Användningen av läkemedlet ska avslutas minst 3 dygn före ett allergitest, så att läkemedlet inte inverkar på tolkningen av testresultaten.

Vuxna och unga över 12 år:
1 tablett en gång om dygnet.

6–11-åriga barn:
½ tablett 1–2 gånger om dygnet.

Preparatet lämpar sig inte för barn under 6 år. För dem finns andra läkemedelsformer.

Om du tar fler Nysstopp-tabletter än du borde

Om du har fått i dig en för stor dos läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 09 471 977) för bedömning av risken och för tilläggssanvisningar.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även Nysstopp orsaka biverkningar. Alla användare behöver emellertid inte få dem.

De vanligaste biverkningarna (förekommer hos 1–10 av hundra användare):

- trötthet eller utmattning
- yrsel eller huvudvärk
- diarré, illamående, muntorrhet

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1–10 av tusen användare):

- rastlöshet
- magsmärtor
- krafftöshet

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1–10 av tiotusen användare):

- nedstämdhet och sömnlöshet
- kramper
- snabb hjärtfrekvens (takykardi)
- svullnad

Om du upptäcker biverkningar, kontakta en läkare eller apotekspersonalen. Detta gäller också alla eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel.

5. Hur Nysstopp-tabletterna ska förvaras

Oåtkomliga och utom synhåll för barn.

Ska förvaras under 30 °C.

Använd inte läkemedlet efter det utgångsdatum som anges på förpackningen (Utg.dat. eller EXP).

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. På så sätt bidrar du till att skydda miljön.

6. Vad förpackningen innehåller och annan information

Nysstopp-tabletternas innehåll

Den aktiva substansen är cetirizin. En tablett innehåller 10 mg cetirizin.

Övriga innehållsämnen är aktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nysstopp 10 mg är vit eller nästan vit, oval och bikonvex och cirka 8 mm lång. På ena sidan av tabletten finns en brytskåra.

Förpackningsstorlekar: Blisterförpackning med 10 eller 30 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Läkemedelsfirma Ab
Tablettvägen 1
12345 Medicinbyn
Finland

Denna bipacksedel granskades senast
10.10.2012

Denna bipacksedel har omskrivits utifrån bipacksedeln för preparat som innehåller cetirizin. De riktiga bipacksedlarna är mer omfattande och detaljerade.