

DE RÄTTA SVAREN PÅ FRÅGORNA FINNS PÅ LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN OCH I BIPACKSEDELN

1. Vad heter läkemedlet och vilken är den aktiva substansen?

- Läkemedlet heter Nysstopp (påhittat namn) och den aktiva substansen är cetirizin.

2. Hur starkt är läkemedlet och i vilken form är den (t.ex. salva, kapsel)?

- Läkemedlet är en tablett och styrkan 10 mg, dvs. en tablett innehåller 10 mg cetirizin.

3. När går läkemedlet ut, dvs. när kan det inte användas längre?

- På läkemedlet finns anteckningen Utg.dag: 12 2015, vilket innebär att läkemedlet går ut i januari år 2016. Läkemedlet ska således användas senast i december 2015 och efter det kan läkemedlet inte längre användas.

4. För vilka ändamål kan läkemedlet användas?

- För behandling och förebyggande av allergiska symtom. Sådana symtom är t.ex. allergisk snuva, allergiska ögonbesvär och allergiskt nässelutslag. Läkemedlet kan därtill användas för hudsymtom som beror på insektsting.

5. Vem får inte använda läkemedlet?

- Läkemedlet får inte användas om man är allergisk för cetirizin eller läkemedlets övriga substanser, eller om man har en allvarlig nedsatt njurfunktion. Om man har epilepsi eller riskerar att få kramper ska man rådgöra med en läkare om användningen av läkemedlet. Därtill ska cetirizin inte användas i tre dygn innan man deltar i allergitest.

6. Hur mycket kan en vuxen ta av läkemedlet?

- För vuxna är dosen 1 tablett en gång per dygn.

7. Hur gamla ska barnen vara för att kunna använda läkemedlet och hur mycket kan de ta av läkemedlet?

- Läkemedlet kan användas av barn som fyllt 6 år och äldre barn. 6–11-åriga barn kan ta 1/2 tablett 1–2 gånger per dygn. Barn över 12 år kan ta samma dos som vuxna, dvs. 1 tablett en gång per dygn. För barn under 6 år finns det andra preparat.

8. Hur tar man läkemedlet?

- Läkemedlet ska tas med en riklig mängd vätska, med vilket avses cirka ett glas vatten.

9. Kan läkemedlet ge biverkningar?

- Läkemedlet kan ge biverkningar, såsom alla läkemedel. De vanligaste biverkningarna är trötthet och utmattning, svindel eller huvudvärk samt diarré, illamående och muntorrhet. Mindre vanliga biverkningar är rastlöshet, magsmärtor och kraftlöshet. Sällsynta biverkningar är nedstämdhet eller sömnlöshet, kramper, snabb hjärtfrekvens och svullnad.

10. Hur ska läkemedlet förvaras?

- Läkemedlet ska förvaras i en temperatur under +30 grader. Läkemedlet ska därtill förvaras så att det är oåtkomligt och utom synhåll för barn.