



ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX





PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

AIVASTUX 10 MG TABLETIT

setiritsiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin jos oireesi pahenevat tai ne eivät lieivity 3 päivän jälkeen
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Aivastux on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Aivastux-tabletteja
3. Miten Aivastux-tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Aivastux-tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Aivastux on ja mihin sitä käytetään

Aivastuxin vaikuttava aine on setiritsiini. Aivastux on allergialääke.

Setiritsiinia käytetään allergisten oireiden hoitoon aikuisilla ja vähintään 6-vuotiailla lapsilla. Tällaisia oireita ovat:

- allerginen nuha (nenän tukkoisuus tai vuotaminen, kutina ja aivastelu),
- allergiset silmäoireet (silmiä punoitus, vuotaminen ja kutina),
- allerginen nokkosihottuma eli urtikaria

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Aivastux-tabletteja

Älä käytä Aivastux-tabletteja:

- jos olet yliherkkä setiritsiinille tai Aivastux-tablettien muille aineille (ks. pakkausselosteen kohta 6.)
- jos olet herkkä hydroksitsiinille tai piperatsiinijohdoksille (tämän lääkevalmisteen vaikuttavan aineen sukulaisaineille)
- jos sinulla on vaikea-asteinen munuaisten vajaatoiminta

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin otat Aivastuxia

- jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta
- jos sairastat epilepsiaa tai sinulla on taipumus saada kouristuksia
- olet menossa allergiatesteihin, tätä lääkettä ei saa käyttää kolmeen vuorokauteen ennen testejä.

Lapset

Älä anna tätä lääkettä alle 6-vuotiaalle lapselle, koska tablettimuoto ei mahdollista tarvittavia annosmuutoksia.

Muut lääkevalmisteet ja Aivastux

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Setiritsiinillä ei odoteta esiintyvän yhteisvaikutuksia.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Aivastux ei yleensä vaikuta heikentävästi tarkkaavaisuuteen tai suorituskykyyn. Joillekin potilaille Aivastux voi aiheuttaa uneliaisuutta tai muita suorituskykyä heikentäviä haittavaikutuksia (ks. pakkausselosteen kohta 4). Tällöin ajamista ja muita tarkkaavaisuutta vaativia tehtäviä on syytä välttää.

3. Miten Aivastux-tabletteja käytetään

Tabletit on otettava riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasillinen vettä).

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret:

1 tabletti kerran vuorokaudessa.

6-12-vuotiaat lapset

½ tablettia 1-2 kertaa vuorokaudessa.

Hoidon kesto

Hoidon kesto riippuu oireidesi luonteesta, kestopista ja etenemisestä. Lääkäri määrittelee hoidon keston.

Jos otat enemmän Aivastux-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09471977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannoksen ottamisen jälkeen seuraavassa mainittuja haittavaikutuksia saattaa esiintyä tavallista voimakkaampana: sekavuus, ripuli, heitehuimaus, väsymys, päänsärky, heikkokuntoisuus, silmien mustuaisten laajeneminen, kutina, levottomuus, lääkkeen rauhoittava vaikutus, uneliaisuus, tokkuraisuus, poikkeavan nopea sydämensyke, vapina ja virtsaumpi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Myös Aivastux voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (1-10 potilaalla sadasta) :

- uneliaisuus tai uupumus
- pyöritys tai päänsärky
- ripuli, pahoinvointi, suun kuivuminen

Melko harvinaiset haittavaikutukset (1-10 potilaalla tuhannesta) :

- levottomuus
- vatsakipu
- voimattomuus

Harvinaiset haittavaikutukset (1-10 potilaalla kymmenestä tuhannesta) :

- mielialan lasku tai unettomuus
- kouristukset
- sydämen nopealyöntisyys
- turvotukset

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Aivastux-tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim. tai EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Aivastux-tabletit sisältävät

Vaikuttava aine on setiritsiini. Yksi tabletti sisältää 10 mg setiritsiiniä.

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, maissitärkkelys ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Aivastux 10 mg on valkoinen tai lähes valkoinen, soikea ja kaksoiskupera tabletti, jonka pituus on n. 8 mm. Tabletin toisella puolella on jakouurre.

Pakkauskoot: 10 tai 30 tablettia läpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Lääketehtäjä Oy
Tablettitie 1
12345 Lääkekylä
Suomi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

24.5.2018

Pakkausseloste on mukailtu setiritsiiniä sisältävien valmisteiden pakkausselosteista. Todelliset pakkausselosteet ovat laajempia ja yksityiskohtaisempia.