

# OIKEAT VASTAUKSET KYSYMYKSIIN LÄÄKEPAKKAUKSESTA JA PAKKAUSSELOSTEESTA

## 1. Minkä niminen lääke on ja mikä on sen vaikuttava aine?

- Lääkkeen nimi on Aivastux (nimi keksitty) ja sen vaikuttava aine on setiritsiini.

## 2. Mikä on lääkkeen vahvuus ja lääkemuoto (esim. voide, kapseli)?

- Lääkkeen lääkemuoto on tabletti ja vahvuus 10 mg, eli yhdessä tablettissa on 10 mg setiritsiiniä.

## 3. Milloin lääke vanhenee, milloin sitä ei voi enää käyttää?

- Lääkkeessä on merkintä Käyt. viim.: 12 2019, joka tarkoittaa, että lääke vanhenee tammikuussa vuonna 2020. Lääkkeen viimeinen käyttökuukausi on siis joulukuu vuonna 2019 ja sen jälkeen lääkettä ei voi enää käyttää.

## 4. Millaisiin tarkoituksiin lääkettä voi käyttää?

- Allergisten oireiden hoitoon ja ehkäisyyn. Tällaisia oireita ovat allerginen nuha, allergiset silmäoireet ja allerginen nokkosihottuma.

## 5. Kuka ei saa käyttää lääkettä?

- Läkettä ei saa käyttää, jos on allerginen setiritsiinille, setiritsiinin sukulaisaineille tai lääkkeen muille ainesosille, tai jos on vaikea-asteinen munuaisten vajaatoiminta. Lääkkeen käytöstä on keskusteltava lääkärin kanssa, mikäli munuaisten vajaatoimintaa, sairastaa epilepsiaa tai on taipumusta kouristeluihin. Lisäksi ennen allergiatestejä täytyy olla käyttämättä setiritsiiniä kolmeen vuorokauteen.

## 6. Kuinka paljon aikuinen voi ottaa lääkettä?

- Lääkkeen annostus aikuisille on 1 tabletti kerran vuorokaudessa.

## 7. Minkä ikäiset lapset voivat käyttää lääkettä ja kuinka paljon he voivat sitä ottaa?

- Läkettä voi käyttää 6-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset. 6–12 -vuotiaat lapset voivat ottaa lääkettä 1/2 tablettia 1–2 kertaa vuorokaudessa. Yli 12-vuotiaille sopii aikuisten annos eli 1 tabletti kerran vuorokaudessa. Alle 6-vuotiaille lapsille on olemassa muita valmistemuotoja.

## 8. Miten lääke otetaan?

- Lääke otetaan runsaan nesteen kera, mikä tarkoittaa noin lasillista vettä.

## 9. Voiko lääkkeellä olla haittavaikutuksia?

- Lääkkeellä voi olla haittavaikutuksia, kuten kaikilla lääkkeillä. Yleisiä haittavaikutuksia ovat uneliaisuus tai uupumus, pyörrytys tai päänsärky, sekä ripuli, pahoinvointi ja suun kuivuminen. Melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat levottomuus, vatsakipu ja voimattomuus. Harvinaisia haittavaikutuksia ovat mielialan lasku tai unettomuus, kouristukset, sydämen nopealyöntisyys ja turvotukset.

## **10. Miten lääkettä säilytetään?**

- Lääke säilytetään alle +30 asteessa. Lisäksi lääke pitää säilyttää siten, että lapset eivät pääse lääkkeeseen käsiksi, eivätkä näe sitä.