

VASTAUKSET ESIMERKKILÄÄKKEISTÄ KIPUPOIS, AIVASTUX, KIPUKURIIN JA NUHAPUIS

Tulehduskipulääke Kipupois 200 mg

Muokattu iburpofeenia sisältävien valmisteiden pakkausselosteiden tiedoista.

1. Kipupois-tabletteja käytetään tilapäisesti kivun ja kuumeen hoitoon, kuten flunssan oireisiin, lihas- ja nivelkipuihin, päänsärkyyn, kuukautiskipuihin, reumasärkyyn tai hammassärkyyn.
2. Annostus:
 - 1–2-vuotiaat (10–14 kg) : ½ tabletti enintään 2 kertaa vuorokaudessa.
 - 2–4 -vuotiaat (14–20 kg) : ½ tabletti enintään 3 kertaa vuorokaudessa.
 - 4–8 -vuotiaat (20–25 kg) : 1 tabletti enintään 3 kertaa vuorokaudessa.
 - 8–12 -vuotiaat (25–40 kg) : 1 tabletti enintään 4 kertaa vuorokaudessa.
 - Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset : 1–2 tabletti enintään 1–3 kertaa vuorokaudessa.
(Aikuiset käyttävät yleensä 400 mg vahvuutta ohjeella 1 tabletti 1–3 kertaa päivässä).
3. Tabletti otetaan suun kautta nielaisemalla ja juodaan noin lasillinen vettä päälle.
4. Lääkettä käytetään tilapäiseen kipuun. Mikäli kipu on jatkuvaa, on syytä käydä lääkärissä.
5. Kaikista lääkkeistä voi tulla haittavaikutuksia. Tämän lääkkeen aiheuttamat haittavaikutukset ovat melko harvinaisia. Yleisimmin lääke saattaa ärsyttää mahaa.
Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat esimerkiksi päänsärky, huimaus ja ihottuma.
6. Lääkäriin tai apteekkiin.

Allergialääke Aivastux 10 mg

Muokattu setiritsiiniä sisältävien valmisteiden pakkausselosteiden tiedoista.

1. Lääkettä käytetään allergisiin oireisiin, kuten kutinaan, nuhaan tai silmäoireisiin.
2. Annostus:
 - 6–12 -vuotiaat: ½ tabletti 1–2 kertaa vuorokaudessa.
 - Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret: 1 tabletti kerran vuorokaudessa.
3. Tabletti otetaan suun kautta nielaisemalla ja juodaan noin lasillinen vettä päälle.
4. Lääkettä käytetään säännöllisesti siitepölykauden ajan ja muulloin aina tarvittaessa.
5. Kaikista lääkkeistä voi tulla haittavaikutuksia. Tämän lääkkeen aiheuttamat haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä. Se voi aiheuttaa päänsärkyä, suun kuivumista ja uneliaisuutta.
Melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat levottomuus ja vatsavaivat.
Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia ovat mielialan lasku, kouristukset ja turvotukset.
6. Lääkäriin tai apteekkiin.

Kipulääke Kipukuriin 500 mg

Muokattu parasetamolia sisältävien valmisteiden pakkausselosteiden tiedoista.

1. Käytetään tilapäisesti kivun ja kuumeen yhteydessä. Tällaisia kipu- ja kuume-tiloja ovat mm. hermo- ja lihassärky, päänsärky, vilustuminen, influenssa, kuukautiskivut tai hammassärky.
2. Annostus on lapsille:
 - 17–25 kg ½ tabletti enintään 3 kertaa vuorokaudessa
 - 25–32 kg ½ -1 tabletti enintään 3 kertaa vuorokaudessa
 - yli 32 kg 1 tabletti enintään 3 kertaa vuorokaudessa.
 - Lääke ei sovi alle 6-vuotiaiden ja alle 17 kg painavien lasten hoitoon

3. Tabletti otetaan suun kautta nielaisemalla ja juodaan noin lasillinen vettä päälle.
4. Lääkettä käytetään tilapäiseen kipuun. Mikäli kipu on jatkuvaa, on syytä ottaa yhteys lääkäriin.
5. Kaikista lääkkeistä voi tulla haittavaikutuksia. Tämän lääkkeen haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia, mutta joillekin käyttäjille voi tulla lisääntyntä mustelmataipumusta, turvotusta tai maksan toimintahäiriöitä.
6. Lääkäriin tai apteekkiin.

Nenäsumute Nuhapois 0,5 mg/ml

Muokattu ksylometatsoliinihydrokloridia sisältävien valmisteiden pakkausselosteiden tiedoista.

1. Lääkettä käytetään tilapäisesti lievittämään tukkoisuutta nuhan ja poskiontelotulehduksen yhteydessä.
2. Annostus:
 - 1–5-vuotiaat lapset
Käyttö aikuisen valvonnassa. 1 suihke kumpaankin sieraimeseen 1 tai 2 kertaa päivässä on yleensä riittävä annos. Lääkettä saa käyttää kumpaankin sieraimeseen enintään kolme kertaa päivässä.
 - 6–11-vuotiaat lapset
Käyttö aikuisen valvonnassa. 1–2 suihketta kumpaankin sieraimeseen tarvittaessa 2-3 kertaa päivässä. Lääkettä saa käyttää kumpaankin sieraimeseen enintään kolme kertaa päivässä.
 - Ei alle 1-vuotiaille lapsille.
3. Lääke suihkautetaan sieraimiin nenän niistämisen jälkeen.
4. Nenäsumutetta voidaan käyttää 1–11-vuotiaille lapsille yhtäjaksoisesti enintään 5 päivän ajan.
5. Kaikista lääkkeistä voi tulla haittavaikutuksia. Yleisimmin tämä lääke voi aiheuttaa nenän limakalvojen kirvelyä ja kuivumista sekä päänsärkyä. Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia ovat sydämen sykkeen kiihtyminen ja yliherkkyysreaktio.
6. Lääkäriin tai apteekkiin.