

TIETOISKU KIPULÄÄKKEIDEN JA ALKOHOLIN SEKAKÄYTÖSTÄ

- Ilman reseptiä ostettavien kipulääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttö ei lisää humalatilaa. Niiden käyttö yhdessä alkoholin kanssa saattaa aiheuttaa kuitenkin vakaviaikin haittavaikutuksia.
- Esimerkiksi uskomus parasetamolivalmisteiden humalluttavasta vaikutuksesta on väärä. Parasetamoli yhdessä alkoholin kanssa aiheuttaa huomattavan riskin maksavaurioihin. Erityisen vaaralliseksi sekakäytön tekee se, että seuraukset ilmenevät vasta muutaman päivän kuluttua. Alkoholin ja parasetamolin sekakäytön paljastuttua onkin heti otettava yhteyttä lääkäriin ja selvitettävä käytetty parasetamolin määrä, vaikka lääkkeen ottaneella henkilöllä ei olisikaan vielä oireita. Mikäli määrä on maksavaurioita aiheuttava, voidaan antaa vasta-ainetta. Parasetamolin ja alkoholin sekakäytöstä syntyneet maksavauriot ovat pysyviä ja voivat pahimmillaan johtaa kuolemaan.
- Myöskään ilman reseptiä ostettavat tulehduskipulääkkeet eivät lisää alkoholin humalluttavaa vaikutusta. Tulehduskipulääkkeiden, siis ibuprofeenin, ketoprofeenin, naprokseenin tai asetyyilisalisyylihapon käyttö yhdessä alkoholin kanssa lisää mm. mahaan ja suolistoon kohdistuvia haittoja, kuten verenvuotoriskiä ja mahahaavan vaaraa.