

VASTAUKSET ESIMERKKILÄÄKKEISTÄ KIPUKURIIN, NUHAPUIS JA SILMIX

Kipulääke Kipukuriin 500 mg

Mukaieltu parasetamolia sisältävien valmisteiden pakkausselosteiden tiedoista

1. Käytetään tilapäisesti kivun ja kuumeen yhteydessä. Tällaisia kipu- ja kuumetiloja ovat mm. hermo- ja lihassärky, päänsärky, vilustuminen, influenssa, kuukautiskivut tai hammassärky.
2. Annostus on yli 6-vuotiaille lapsille:
 - 17–25 kg: ½ tablettia enintään 3 kertaa vuorokaudessa,
 - 25–32 kg: ½ -1 tablettia enintään 3 kertaa vuorokaudessa,
 - yli 32 kg 1 tabletti enintään 3 kertaa vuorokaudessaAlle 6-vuotiaille ja alle 17 kg painaville lapsille lääke ei sovi
3. Tabletti otetaan suun kautta nielaisemalla ja juodaan noin lasillinen vettä päälle.
4. Lääkettä käytetään tilapäisesti ja lyhytaikaisesti ja vain silloin, kun on oireita.

Nenäsumute Nuhapois 0,5 mg/ml

Mukaieltu ksylometatsoliinihydrokloridia sisältävien valmisteiden pakkausselosteiden tiedoista

1. Lääkettä voidaan käyttää, jos nenä on tukossa, esimerkiksi flunssan tai poskiontelontulehduksen vuoksi.
2. Annostus on lapsille iän mukaan:
 - 1–5-vuotiaat lapset: Käyttö aikuisen valvonnassa. 1 suihke kumpaankin sieraimen 1 tai 2 kertaa päivässä on yleensä riittävä annos. Lääkettä saa käyttää kumpaankin sieraimen enintään kolme kertaa päivässä.
 - 6–11-vuotiaat lapset: Käyttö aikuisen valvonnassa. 1–2 suihketta kumpaankin sieraimen tarvittaessa 2-3 kertaa päivässä. Lääkettä saa käyttää kumpaankin sieraimen enintään kolme kertaa päivässä.
- Ei alle 1-vuotiaille lapsille.
3. Lääke suihkautetaan sieraimiin. Nenä niistetään ennen lääkkeen ottamista.
4. Nuhapois 0,5 mg/ml -nenäsumutetta voidaan käyttää 1–11-vuotiaille lapsille yhtäjaksoisesti enintään 5 päivän ajan.

Allergiasilmätippa Silmix 20 mg/ml

Mukaieltu natriumkromoglikaattia sisältävien valmisteiden pakkausselosteiden tiedoista.

1. Lääkettä käytetään lievittämään ja ennaltaehkäisemään allergisia silmäoireita, kuten punoitusta ja kutinaa.
2. Annostus aikuisille ja yli 4-vuotiaille lapsille: 1–2 tippaa kumpaankin silmään 4 kertaa vuorokaudessa.
3. Lääkettä tiputetaan silmiin. Ensin pestään kädet. Pää taivutetaan taaksepäin tai ruvetaan makaamaan selälleen. Raotetaan alaluomea, jonne tipat tiputetaan. Varotaan koskettamasta pullon kärjellä silmää. Jos silmään laitetaan 2 tippaa, tippojen välillä pidetään noin 5 minuutin tauko.

4. Lääkettä voi käyttää koko siitepölykauden ajan, mutta avattu pullo on käyttökelpoinen 28 päivää, jonka jälkeen pitää hankkia uusi silmätippapullo. Lääkehoito on hyvä aloittaa ennen siitepölykauden alkamista ja se pitää aloittaa viimeistään ensioireiden ilmaannuttua.