

RÄTT SVAR TILL KORSORDET RÄTT ANVÄNDNING AV LÄKEMEDEL

1. Åtta

Om det i anvisningarna för antibiotika står "en tablett tre gånger om dygnet", efter hur många timmar ska du ta en ny tablett?

2. På fastande mage

Innebär att läkemedlet tas minst en timme före en måltid eller 2–3 timmar efter en måltid.

3. Vatten

Läkemedlet ska tas tillsammans med ett glas vatten.

4. Receptbelagt läkemedel

Det kan endast ordineras av en läkare, i vissa fall av en specialutbildad sjukskötare.

Även dosen ordineras individuellt av en läkare.

5. Engångsdos

Avser den mängd läkemedel som tas på en gång.

6. Egenvårdsläkemedel

De kan köpas på apoteket utan recept och anvisningar om hur de ska användas samt om dosen finns på förpackningen.

7. Information

För att du ska kunna använda läkemedlet rätt, lönar det sig att skaffa detta t.ex. genom att studera förpackningen eller bipacksedeln eller genom att inhämta detta av en läkare eller av apotekspersonalen.

8. Biverkningar

Man vill inte att ett läkemedel ska orsaka detta. I fråga om det egna läkemedlet bör man reda ut vilka av dessa som är harmlösa och när det är motiverat att uppsöka eller ringa en läkare.

9. Solen

Kan orsaka att huden lätt bränns i samband med vissa läkemedel.

10. Förgiftning

Om man får i sig mer läkemedel än vad som doseringsanvisningarna anger, kan detta vara följden.

11. Tablett

Det här läkemedlet tas via munnen.

12. Vid behov

Värkmedicin mot huvudvärk tas inte regelbundet varje dag utan endast vid behov.

13. Ställ

Var aktiv och ställ frågor om ditt läkemedel.

14. Tillfälligt

Egenvårdsläkemedel är i allmänhet inte avsedda för långvarigt bruk, utan de ska endast användas tillfälligt.

15. Kur

En antibiotika kur ska alltid ätas till slut, så att alla bakterier som orsakat sjukdomen säkert dör.

13. Ställ

Var aktiv och ställ frågor om ditt läkemedel.

14. Tillfälligt

Egenvårdsläkemedel är i allmänhet inte avsedda för långvarigt bruk, utan de ska endast användas tillfälligt.

15. Kur

En antibiotika kur ska alltid ätas till slut, så att alla bakterier som orsakat sjukdomen säkert dör.

16. Allergi

Om läkemedlet orsakar detta, kan du inte använda det. En sådan kan t.ex. uppstå mot penicillin.

17. Förvaringstemperatur

För vissa läkemedel krävs en förvaringstemperatur på +2–+8 °C, vilket innebär att läkemedlen ska förvaras i kylskåp.

18. Vuxen

Ger läkemedlet till ett barn.

19. Dosen

Dosen för ett receptbelagt läkemedel är individuell. För ett egenvårdsläkemedel finns uppgifter om dosen på förpackningen.

20. Apotek

Här kan du fråga råd i ärenden som berör dina läkemedel.

21. Bipacksedeln

Det lönar sig att läsa detta innan man börjar använda ett läkemedel.