

SVAR OM EXEMPELLÄKEMEDLEN ONTBORT, NYSSTOPP, VÄRKBORT OCH SNUVTORR

Inflammationshämmande och smärtstillande medel Ontbort 200 mg

Omskriven utifrån uppgifterna i bipacksedeln för preparat som innehåller ibuprofen.

1. Ontbort-tabletter används tillfälligt för behandling av smärta och feber, till exempel vid förkylningssymtom, muskel- och ledvärk, huvudvärk, menstruationssmärta, reumatisk värk eller tandvärk.
2. Dosering:
 - 1–2-åringar (10–14 kg): ½ tablett högst 2 gånger per dygn,
 - 2–4-åringar (14–20 kg): ½ tablett högst 3 gånger per dygn,
 - 4–8-åringar (20–25 kg): 1 tablett högst 3 gånger per dygn
 - 8–12-åringar, (25–40 kg): 1 tablett högst 4 gånger per dygn
 - Vuxna och barn över 12 år: 1–2 tabletter högst 1–3 gånger per dygn (Vuxna använder i allmänhet 400 mg styrka med anvisningen 1 tablett 1–3 gånger per dag),
3. Tabletten tas genom munnen och sväljs tillsammans med ett glas vatten.
4. Läkemedlet används vid tillfällig värk. Om smärtan är ihållande, är det skäl att gå till läkare.
5. Alla läkemedel kan ge biverkningar. De biverkningar som detta läkemedel orsakar är mindre vanliga. Det vanligaste är att läkemedlet irriterar magen.
Andra möjliga biverkningar är t.ex. huvudvärk, svindel och eksem.
6. Kontakta läkare eller apotek.

Allergiläkemedlet Nysstopp 10 mg

Omskriven utifrån uppgifterna i bipacksedeln för preparat som innehåller setirizin.

1. Läkemedlet används för allergiska symtom, såsom kittlande näsa, snuva eller ögonbesvär.
2. Dosering:
 - 6–12-åringar: ½ tablett 1–2 gånger per dygn.
 - Vuxna och unga över 12 år: 1 tablett en gång per dygn.
3. Tabletten tas genom munnen och sväljs tillsammans med ett glas vatten.
4. Läkemedlet ska användas regelbundet under pollenperioden och annars alltid vid behov.
5. Alla läkemedel kan ge biverkningar. Biverkningarna av detta läkemedel är i allmänhet lindriga och övergående. Läkemedlet kan orsaka huvudvärk, muntorrhet och trötthet. Mindre vanliga biverkningar är rastlöshet och magsmärta. Sällsynta biverkningar är nedstämdhet, kramper och svullnad.
6. Kontakta läkare eller apotek.

Smärtstillande medel Värkslut 500 mg

Omskriven utifrån uppgifterna i bipacksedeln för preparat som innehåller paracetamol.

1. Används tillfälligt för behandling av smärta och feber. Sådana feber- och smärttillstånd är bland annat nervsmärta, muskelvärk, huvudvärk, förkylning, influensa, menstruationssmärtor och tandvärk.
2. Doseringen för barn:
 - 17–25 kg ½ tablett högst 3 gånger per dygn
 - 25–32 kg ½–1 tablett högst 3 gånger per dygn
 - över 32 kg 1 tablett högst 3 gånger per dygn
 - Läkemedlet är inte lämpligt för behandling av barn under 6 år och under 17 kg
3. Tabletten tas genom munnen och sväljs tillsammans med ett glas vatten.
4. Läkemedlet används vid tillfällig värk. Om smärtan är ihållande, är det skäl att gå till läkare.
5. Alla läkemedel kan ge biverkningar. Detta läkemedel ger sällan biverkningar, men för vissa användare kan det öka benägenheten för blånader, svullnad eller störningar i leverfunktionen.
6. Kontakta läkare eller apotek.

Nässpray Snuvtorr 0,5 mg/ml

Omskriven utifrån uppgifterna i bipacksedeln för preparat som innehåller xylometazolinhydrochlorid.

1. Läkemedlet används tillfälligt för att lindra nästäppa vid snuva och vid bihåleinflammation.
2. Dosering:
 - Barn 1–5 år:
Användningen måste övervakas av vuxna. 1 sprayning i vardera näsborren 1 eller 2 gånger dagligen är vanligen en tillräcklig dos. Läkemedlet kan användas i vardera näsborren högst tre gånger per dygn.
 - Barn 6–11 år:
Användningen måste övervakas av vuxna. 1–2 spraydoser vid behov i vardera näsborren 2–3 gånger per dygn. Läkemedlet kan användas i vardera näsborren högst tre gånger per dygn.
 - Inte för barn under 1 år.
3. Läkemedlet sprayas i vardera näsborren efter att man snutit näsan.
4. Nässprayen kan användas av 1–11 år gamla barn högst 5 dagar i följd.
5. Alla läkemedel kan ge biverkningar. Det vanliga är att detta läkemedel kan orsaka svidande och torra slemhinnor samt huvudvärk. Sällsynta biverkningar är snabb hjärtklappning och överkänslighetsreaktioner.
6. Kontakta läkare eller apotek.