

FAKTA OM BLANDBRUK AV SMÄRTSTILLANDE LÄKEMEDEL OCH ALKOHOL

- Samtidig användning av receptfria smärtstillande medel och alkohol gör inte fyllan starkare. Däremot kan användning av läkemedel samtidigt med alkohol orsaka även allvarliga biverkningar.
- Det är till exempel en missuppfattning att paracetamolpreparat har en berusande effekt. Paracetamol tillsammans med alkohol orsakar en betydande risk för leverskador. Blandbruk är särskilt farligt då följderna uppkommer först efter några dagar. Om du upptäcker att någon samtidigt använder både alkohol och paracetamol, ska du kontakta en läkare och ta reda på mängden paracetamol som har använts även om personen som har tagit läkemedlet inte ännu har några symtom. Om mängden kan orsaka leverskador, kan personen ges antikroppar. Samtidig användning av paracetamol och alkohol ger upphov till bestående leverskador som kan leda till döden.
- Fyllan blir inte heller starkare genom att ta receptfria antiinflammatoriska medel samtidigt med alkohol. Användning av antiinflammatoriska medel, dvs. ibuprofen, ketoprofen, naproxen och acetylsalicylsyra, tillsammans med alkohol ökar bland annat risken för skador i mag-tarmkanalen, exempelvis blödningar eller magsår.